3	Poil simple ou bifurqué (0 mm. 4) 20 fois plus long que large, présentant quelquefois des ramifications dans la partie supérieure.....	*A. pubescens* DC [1].
	Poil ramifié dès le tiers inférieur (quelquefois mélangé de poils simples ou bifurqués), à ramifications longues et nombreuses.....	4
	Poil simple ou bifurqué très court (cinq fois plus long que large).....	6
4	Poil coralliforme, cinq à six fois plus long que large, articles distincts, élargis à la base (six à sept) (longueur 0 mm. 25).....	*A. ciliata* DC.
	Poil étoilé coralliforme, très rameux, articles peu distincts (longueur 0 mm. 25).....	5
5	Poil étoilé coralliforme hyalin, dix à quinze fois plus long que large, à fines aspérités.....	*A. imbricata* Lam.
	Poil étoilé coralliforme, très ramifié en tous sens, dix fois plus long que large, à aspérités rugueuses.....	*A. alpina* Lam.
6	Poil simple ou bifurqué, très court (0 mm. 15), cinq fois plus long que large, très tuberculeux, plus ou moins obtus au sommet, articulations peu nombreuses (deux ou trois), deux fois aussi longues que larges.....	*A. pyrenaica* Lam.

Dans ce tableau, les poils les plus longs sont au commencement, les plus courts, à la fin.

Quant aux dimensions relatives, elles sont prises sur la moyenne.

Il est donné lecture de la communication qui suit :

Sur la présence d'un *Abies* nouveau au Maroc (*Abies marocana*),

PAR M. L. TRABUT.

M. Joly, qui a exploré dernièrement les montagnes de Tétuan et qui y a découvert le *Viscum cruciatum* [2] sur l'Olivier, nous a fait parvenir ces jours-ci de la même région des rameaux d'un *Abies*.

A première vue, ce Sapin a beaucoup d'analogie avec l'*A. Pinsapo* Boiss.; mais l'examen de la feuille permet facilement

1. J'ai rattaché l'*A. hirtella* comme variété, les poils sont plus ramifiés dans la partie supérieure que dans l'*A. pubescens*; le tableau dichotomique comprend les deux plantes.

2. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 1905, p. 501.



Picea marocana Trabut.